

CT marcaïnisatie OSG

Marcaïnisatie van de enkel via CT-scan

Uw behandelend arts heeft in overleg met u een marcaïnisatie van het onderste spronggewricht (de enkel) met behulp van de CT-scan aangevraagd. Door een verdovingsvloeistof in het gewricht te brengen, wordt gekeken of de pijn van dat gewricht minder wordt. Dit merkt u in de periode na de injectie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd arts, de radioloog. Deze wordt bijgestaan door een radiodiagnostisch laborant of doktersassistente.

Röntgenstralen

Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Röntgenstralen zijn niet zichtbaar of voelbaar. Hoewel röntgenstralen nadelig kunnen zijn voor de mens, is dit röntgenonderzoek voor het stellen van een diagnose vaak onmisbaar. De straling bij dit röntgenonderzoek is zo gering dat u niet ongerust hoeft te zijn over de nadelige effecten van deze straling.

Zwangerschap

Onderzoeken waarbij röntgenstraling wordt gebruikt kunnen beter niet worden uitgevoerd als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel dient het onderzoek te worden uitgevoerd in de eerste week na de menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak in overleg met de Radiologie afdeling.

Overgevoeligheid

Indien u astmatisch of allergisch bent, meldt dit dan voor het onderzoek aan de radioloog of de medewerker.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. U kunt na het onderzoek geen auto besturen. Het is wenselijk dat u voor begeleiding zorgt.

Hoe wordt een marcaïnisatie van het gewricht gedaan?

Voor het onderzoek wordt u gevraagd de schoenen en sokken uit te doen. Dit doet u in een kleedkamer waarvan u de toegangsdeur aan de gangzijde kunt afsluiten. U wordt verzocht op de onderzoektafel van de CT-scan te gaan liggen. De tafel wordt tijdens het onderzoek automatisch door de CT-scan geschoven. Aan de hand van de foto's die worden gemaakt, bepaalt de radioloog de plaats van de punctie. Deze plaats wordt met huidstift aangegeven. Van het gewricht dat behandeld gaat worden, wordt de huid met een desinfecteervloeistof schoongemaakt. De radioloog kijkt met behulp van de CT waar hij/zij gaat prikken. De radioloog geeft u daar eerst een plaatselijke verdoving. Vervolgens wordt een dun naaldje in het gewrichtskapsel geplaatst. Door dit naaldje wordt eerst wat contrastvloeistof gespoten om er zeker van te zijn dat het in het gewrichtskapsel zit, daarna volgt de verdovende vloeistof. Vervolgens wordt het naaldje verwijderd.

Duur van het onderzoek

In het algemeen duurt het onderzoek 30 minuten.

Na het onderzoek

Het gewricht is nu verdoofd. De verdoving trekt weg na een aantal uren. In de eerste uren moet u kijken en opschrijven of de pijn minder wordt, verdwenen is of niet veranderd is. U wordt geadviseerd voorzichtig te lopen, maar wel de bewegingen te maken waarbij u normaal gesproken pijn heeft. U kunt na het onderzoek geen auto besturen. Het is wenselijk dat u voor begeleiding zorgt.

De uitslag

De radioloog stuurt het verslag van het onderzoek naar uw behandelend arts.

Belangrijk

De CT-scanner wordt ook voor spoedgevallen gebruikt. Het kan voorkomen dat u daardoor iets langer moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor. De medewerkers doen hun best u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek. Als u om wat voor reden dan ook de afspraak niet kunt nakomen, dan verzoeken wij u dringend dit zo snel mogelijk te melden. Zo kunnen wij de wachtlijst zo kort mogelijk houden.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Radiologie afdeling, bereikbaar:

- van maandag tot en met vrijdag
- tussen 8.30 - 16.30 uur
- telefoon: (070) 210 2349

U kunt ook contact opnemen met uw behandelend arts. De laboranten vertellen u vlak voor het onderzoek wat er gaat gebeuren. U kunt natuurlijk ook aan hen vragen stellen.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen van de folder enkele vragen beantwoorden? De vragen vindt u via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Hartelijk bedankt alvast.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

147417022023