

## Histamine-provocatietest bij kinderen

Uw kind krijgt binnenkort een histamine-provocatietest. Tijdens dit onderzoek meten we hoeveel lucht uw kind in 1 seconde kan uitblazen na het inademen van histamine. Voor uw kind is het belangrijk om te weten dat het onderzoek niet pijnlijk is en dat er niet wordt geprikt. De ouders/verzorgers kunnen bij het onderzoek aanwezig zijn. Het onderzoek duurt ongeveer 75 minuten.

### Waarom een histamine-provocatietest?

Door histamine in te ademen, kan getest worden of uw kind gevoelige luchtwegen heeft. Histamine wordt ook door het eigen lichaam aangemaakt. Het is een onschadelijke stof. Wel kan histamine een prikkelende werking geven op de luchtwegen.

### Hoe verloopt de test?

Tijdens de test ademt uw kind histamine in verschillende concentraties in. Na elke concentratie blaast uw kind hard in een apparaat. Als de longfunctieanalist aan de uitslag ziet dat er minder wordt uitgeblazen, krijgt uw kind een luchtwegverwijder. Hierdoor zullen de klachten snel verdwijnen.

Via de volgende link kunt u een filmpje zien van het metacholineonderzoek. Dit is een vergelijkbaar onderzoek: <https://www.Youtube.com/watch?v=opmyrmY9O4c>

### Klachten tijdens en na de test

Door het inademen van histamine kan uw kind tijdens de test een aantal klachten krijgen. De meest voorkomende klachten zijn hoesten en een gevoel van benauwdheid. Na de test kan het zijn dat de stem wat hees is, maar deze klachten gaan snel weer over.

### Kom op tijd

Het is belangrijk dat u en uw kind op tijd komen. Als u te laat bent, bestaat er een kans dat het onderzoek niet doorgaat. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

### Hoe bereidt u uw kind thuis voor?

Voor de test mogen een aantal medicijnen tijdelijk niet ingenomen worden:

**Kortwerkende luchtwegverwijders: 8 uur van tevoren stoppen**

Onder andere:

- Salbutamol (Airomir, Combivent, Salbutamol, Ventolin)
- Ipratropium (Atrovent, Berodual, Combivent, Ipratropium)
- Fenoterol (Berodual)
- Terbutaline (Bricanyl)

**Langwerkende luchtwegverwijders: 36 uur van tevoren stoppen**

Onder andere:

- Formotero (Atimos, Foradil, Formoterol, Foster, Oxis, Symbicort)
- Salmeterol (Seretide, Serevent)
- Tiotropium (Spiriva)

Medicijnen tegen allergie (onder andere: Desloratadine, Levocetizine en Fexofenadine): **3 dagen van tevoren** stoppen.

Als u twijfelt of uw kind met de longmedicatie kan stoppen, mail uw vraag dan naar [longfunctie-jkz@hagaziekenhuis.nl](mailto:longfunctie-jkz@hagaziekenhuis.nl)

## Wat moet u doen als uw kind niet met de longmedicatie kan stoppen?

Het kan gebeuren dat uw kind niet met de longmedicatie kan stoppen vanwege benauwdheid. In dit geval kan uw kind de medicatie gewoon blijven gebruiken, maar kan de test niet doorgaan.

## Wanneer krijgt u de uitslag?

Bij uw eerstvolgende bezoek aan de kinderarts bespreekt de arts de uitslag van het onderzoek met u. Dit kan ook telefonisch zijn.

---

## Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

### Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

### Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

## Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

## Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

158523072024