

Te stoppen longmedicatie (Bijlagen A + B)

Binnenkort krijgt u een longfunctieonderzoek. In deze patiënteninformatie staat met welke medicijnen u vóór dit onderzoek moet stoppen. Dit kan een aantal uren zijn of een aantal dagen. Leest u deze informatie daarom goed door.

Bijlage A: Te stoppen longmedicatie

6 uur voor het onderzoek stoppen

Merknaam: **Werkzame stof:**

Airomir Salbutamol

Bricanyl Terbutaline

Ventolin Salbutamol

12 uur voor het onderzoek stoppen

Merknaam: **Werkzame stof:**

Atrovent Ipratropium

Combivent Salbutamol + Ipratropium

Berodual Fenoterol + Ipratropium

36 uur voor het onderzoek stoppen

Merknaam: **Werkzame stof:**

AirFluSal
Forspiro Salmeterol + Fluticason

Aerivo Salmeterol + Fluticason

Atimos Formoterol

Bufoleer
Easyhaler Formoterol + Budesonide

Busalair Salmeterol + Budesonide

Duaklir
Genuair Aclidinium + Formoterol

48 uur voor het onderzoek stoppen

Merknaam: **Werkzame stof:**

Daxas Roflumilast
Actieve metaboliet

Onbrez Indacaterol

Relvar Ellipta Fluticasonfuroaat/vilanterol

Striverdi Olodaterol

Theolair
Retard Theofylline

Unilair Theofylline

DuoResp Spiromax	Formoterol +Budesonide		
Elpenhaler	Salmeterol + Fluticason	168 uur (één week) voor het onderzoek stoppen	
Eklira Genuair	Acclidinium	Merknaam:	Werkzame stof:
Flutiform	Formoterol + Fluticason	Anoro	Umeclidinium/vilanterol
Foradil	Formoterol	Incruse Ellipta	Umeclidinium
Foster	Formoterol +Beclomethason	Seebri	Glycopyrronium
Oxis	Formoterol	Spiriva	Tiotropium
Seretide	Salmeterol + Fluticason	Spiolto	Tiotropium/Olodaterol
Serevent	Salmeterol	Tiotrus Zonda	Tiotropium
Symbicort	Formoterol + Budesonide	Xoterna	Indacaterol/Glycopyrronium
Singular	Montelukast	Ultibro	Indacaterol/Glycopyrronium
Semprex	Acrivastine	Trimbow	Beclometasondipropionaat/ formoterolfumaraatdihydraat/ Glycopyrronium
		Trelegy Ellipta	Fluticason/Vilanterol/Umeclidinium

Het is NIET nodig om te stoppen

Merknaam:	Werkzame stof:
Qvar	Beclometason
Flixotide	Fluticasonpropionaat
Pulmicort	Budesonide
Ivesco	Ciclesonide

Bijlage B: Te stoppen longmedicatie

Extra stakingsregels voorafgaand aan de histamine bronchiale hyperreactiviteitstest: 72 uur (3 dagen) van te voren staken

Merknaam:	Werkzame stof:
Aerius, Neoclarityn	Desloratadine
Allerfre, Claritine	Loratadine
Hydroxyzine	Hydroxyzine
Cinnarizine	Cinnarizine
Cyclizine	Cyclizine
Emesafene	Meclozine/Pyridoxine
Fenistil	Dimetindeenwaterstofmaleaat
Kestine	Ebastine
Ketotifen, Zaditen	Ketotifen
Promethazine	Promethazine
Reactine, Zyrtec, Prevalin allerstop	Cetirizine
Semprex	Acrivastine
Suprimal	Meclozine
Tavegyl	Clemastine
Telfast	Fexofenadine
Xyzal	Levocetirizine
Nedeltran	Alimenazine