

Blaasbipten

Uw behandelend uroloog heeft met u besproken, dat er enkele hapjes/stukjes uit uw blaasslijmvlies worden genomen voor weefselonderzoek. Daarvoor wordt u geopereerd. In deze folder kunt u de gang van zaken omtrent de operatie nog eens rustig nalezen.

Diagnose stellen

Na bespreking van uw klachtenpatroon en lichamelijk onderzoek, heeft de uroloog waarschijnlijk urineonderzoek en eventueel een bloedonderzoek laten doen. Het is vaak noodzakelijk om ook een cystoscopie te verrichten (= met een kijkbuisje de blaas van binnen bekijken).

Deze onderzoeken geven niet altijd voldoende informatie over wat er aan de hand is. Het nemen van hapjes/ stukjes uit de blaas (= blaasbipten) kan veel informatie opleveren. Na weefselonderzoek van deze bipten is de uroloog meestal in staat een diagnose te stellen bij uw klachtenpatroon. Een behandeling van de aandoening kan dan gestart worden.

Blaasbipten nemen is geen behandeling, maar een onderdeel van een diagnostisch onderzoek.

Operatie/blaasbipten

De bipten van het blaasslijmvlies worden via de plasbuis afgenomen, door middel van een kijkoperatie in de blaas. Deze stukjes blaasslijmvlies worden opgestuurd naar het laboratorium en door de patholoog anatoom onderzocht. Dit duurt 10 -14 dagen. U krijgt van dat weefselonderzoek de uitslag als u op de polikliniek Urologie komt voor controle na de operatie.

Verblijf in het ziekenhuis

Afhankelijk van wat er met u afgesproken is, komt u de dag voor de operatie naar de afdeling of op de dag van de operatie. In het laatste geval moet u nuchter zijn. Bloedverdunnende medicatie zijn in overleg met uw arts en/of de anesthesist gestopt, tenzij anders met u is besproken. De verpleegkundige informeert u verder uitgebreid over de gang van zaken op de verpleegafdeling.

Vervolgens gaat u naar de operatiekamer. De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie en/of ruggenprik. Na de operatie krijgt u een katheter in de blaas (=een slangetje waardoor de urine wordt afgevoerd). Aan deze katheter zit een spoelsysteem, waardoor spoelvloeistof in de blaas wordt gespoeld, dit loopt er direct weer uit via de katheter. De urine kan bloederig zijn. Als de urine weer helder is, mag het spoelsysteem eraf en mag later ook de katheter worden verwijderd.

Afhankelijk van uw behandelend uroloog en uw lichamelijke conditie mag u, als u goed geplast heeft, naar huis. De ontslagdag kan variëren van een tot drie dagen na de operatie.

Weer thuis/ leefregels na blaasbipten

Direct na het verwijderen van de katheter is het mogelijk dat u de plas moeilijk kunt ophouden. Ook kan het plassen zelf een wat branderig/schrijnend gevoel geven in de plasbuis. Dit is een normaal verschijnsel. Leeg de blaas op tijd, bijvoorbeeld elke drie uur.

Om goed uit te plassen, kunt u beter zittend plassen. Na vier tot zes weken zijn de wondjes in de blaas weer volledig geheeld. Gedurende deze periode kunt u nog problemen met plassen ervaren. In deze periode is bloedverlies via de urine nog mogelijk. Het is wel de bedoeling dat dit geheel verdwijnt in de loop van deze vier tot zes weken.

Wij adviseren u gedurende deze periode de volgende leefregels voor een goede wondgenezing:

- Drink voldoende (min. 1,5 liter water per dag **extra**).
- Vermijd zo mogelijk alcoholische dranken (vanwege bloedverdünnend effect).
- Vermijd zware lichamelijke arbeid.
- Vermijd langdurige autoritten.
- Niet sporten.
- Probeer niet te persen bij de ontlasting.

Indien u reeds thuis bloedverdünnende middelen (bijv. Ascal, Marcoumar) heeft gebruikt, attenderen wij u erop om in de gaten te houden wanneer u van de uroloog weer mag starten met deze medicatie.

Complicaties

Mocht u thuis door de operatie problemen ervaren, zoals koorts (>38,5), erg veel bloed/stolsels bij de urine, moeite met plassen, aanhoudende branderigheid bij plassen; dan kunt u tijdens werkdagen bellen met de polikliniek Urologie. Tijdens de overige uren kunt u terecht bij de spoedeisende hulp.

Deze operatie is een relatief kleine ingreep. Toch kunnen er zoals bij elke operatie complicaties optreden, zoals:

- Pijn in het operatiegebied. Hiervoor kunt u pijnmedicatie nemen zoals driemaal daags 2 paracetamol tabletten 500mg. Neemt u geen aspirine, deze werkt bloedverdünnend.
- Een stijf of pijnlijk gevoel in de bovenbenen, dit komt door uw houding tijdens de operatie en verdwijnt na een week.
- Urineweginfectie. Daarvoor zult u antibiotica krijgen. Goed drinken is erg belangrijk bij het voorkomen en bestrijden van een infectie.
- Overmatig bloedverlies via de urine. Tijdens uw ziekenhuisverblijf houden de artsen en verpleging dit goed in de gaten.
- Goed drinken is ontzettend belangrijk om de blaas en het wondgebied steeds te spoelen!
- De blaas kan wat kramperig aanvoelen. Het kan verlichting geven hiervoor tijdelijk medicatie te gebruiken. Dit gaat in overleg met de uroloog via de polikliniek Urologie.

Contact

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 2860. De spoedeisende hulp kunt u bereiken via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis: (079) 346 2626.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

505620032025