

Dikke darm scopie (Sigmoidoscopie met klysma)

Inleiding

Bij dit onderzoek kan de binnenzijde van de endeldarm bekeken worden. Dit is mogelijk met behulp van de zogenaamde sigmoidoscoop of de coloscoop. Dit is een dunne buigzame slang met een doorsnede van ± 1 cm, waarbij men met behulp van licht de darmwand aan de binnenkant kan bekijken. De sigmoidoscoop wordt gebruikt om het laatste gedeelte van de dikke darm te bekijken.

Het onderzoek

Het onderzoek gebeurt in rugligging, soms in linkerzijligging. Bij de rugligging steunen de beide onderbenen in beenhouders waardoor de knieën opgetrokken zijn. In de linkerzijligging is het belangrijk zo goed mogelijk met opgetrokken knieën en met de neus naar de knieën te gaan liggen. De scoop wordt rectaal (via de anus) ingebracht. Dit kan even pijnlijk zijn. De dokter zal u precies vertellen wat er gebeurt. De scoop wordt langzaam in de darm opgeschoven. Om de darm goed te ontplooien wordt er af en toe via de scoop wat lucht ingeblazen. Dit kunt u voelen. De lucht veroorzaakt soms krampen. Het is belangrijk dat u de lucht gewoon weer langs de normale weg laat ontsnappen. Schaamt u zich niet, we zijn er aan gewend.

Wanneer de darmkrampen zeer hevig en pijnlijk zijn, kan de dokter u een injectie geven tegen deze krampen. Soms worden er stukjes weefsel uit darmwand weggenomen voor verder onderzoek. Hier voelt u niets van. Wel bestaat daardoor de kans dat er bij de eerste ontlasting na het onderzoek iets bloed zit. Het onderzoek duurt ± 15 min. Direct na het onderzoek hoort u, indien mogelijk, de voorlopige uitslag.

Vorbereiding voor het onderzoek

Om het darmslijmvlies goed te beoordelen moet de darm volkomen of zo goed mogelijk schoon zijn. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een klysma. Dit klysma krijgt u een half uur of een uur van tevoren op de afdeling. Op de dag van het onderzoek mag u gewoon blijven eten en drinken.

Medicijngebruik

Door u gebruikte medicijnen kunt u ook op de ochtend van het onderzoek gewoon met water innemen. Het gebruik van ijzertabletten (staalpillen) dient 3 dagen voor het onderzoek te worden gestaakt.

Let op

- Gebruikt u antistolling (“bloedverdunners”), meldt u dat nadrukkelijk aan uw specialist bij het maken van de afspraak
- Bent u diabetespatiënt en gebruikt u insuline, overleg dan eerst met uw specialist wanneer insuline te spuiten na het onderzoek.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. U kunt contact opnemen met het endoscopiecentrum van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 09.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

513427072023