

Gastro- en bronchoscopie voor diabetespatiënten die tabletten en/of insuline gebruiken

Inleiding

U bent door uw huisarts of specialist doorverwezen voor een onderzoek bij het endoscopiecentrum van het HagaZiekenhuis Zoetermeer. Omdat u diabetespatiënt bent en tabletten en/of insuline gebruikt, gelden voor u aanvullende richtlijnen.

Algemeen

- In principe wordt uw afspraak voor onderzoek vóór 13.00 uur ingepland.
- Als u insuline gebruikt, is het belangrijk is dat u uw bloedsuiker op deze dag, 's ochtends vóórdat u naar het ziekenhuis komt, controleert.
- Bij een hypoglycaemie (te laag bloedsuiker) mag u aangelengde limonade of Dextro nemen. Dit hoeft het onderzoek niet te hinderen. Het is wel belangrijk dat u dit dan meldt aan de endoscopie-assistente.
- Indien u een combinatie van tabletten en insuline gebruikt, volgt u zowel de instructies voor tabletgebruikers als die voor insulinegebruikers.

Richtlijnen tabletgebruikers

U neemt geen medicatie meer in op de dag van het onderzoek. Bij de eerstvolgende maaltijd na het onderzoek begint u weer met de medicijnen

Richtlijnen bij insulinegebruik:

- 1 x daags langwerkende insuline: (insulatard, Levemir, Lantus, Toujeo, Abasaglar of Tresiba) vaak in combinatie met tabletten.
- 4-5 x daags kortwerkende insuline: (novorapid, Apidra, humalog, Fiasp icm Insulatard, Levemir, Lantus, Toujeo, Abasaglar of Tresiba)
- GLP 1; Victoza, Bydureon, Byetta, Lyxumia, Frulicity, Xultophy, Ozempic en Suliqua

De avond vóór het onderzoek

- De **avonddosis langwerkende** insuline wordt met 25 % gereduceerd, dwz u spuit **¾ van de gebruikelijke dosis**.
- De dosis **Tresiba** kan onveranderd gespoten worden.
- **GLP 1** kan gewoon gespoten worden.

Dag ván het onderzoek

- Als u normaal gesproken **'s ochtends langwerkende** insuline gebruikt, spuit u de ochtend vóór het onderzoek, **de helft** van uw gebruikelijke dosering. van uw gebruikelijke dosering.
- Als u normaal 's ochtends **kortwerkende** insuline gebruikt dan gebruikt u géén kortwerkende insuline.

Richtlijnen bij gebruik mix-insulines 2 x daags (mixtard, humamix, novomix, ryzodeg)

- U mag 's ochtends niet eten en u gebruikt **géén** insuline.
- Vóór de eerstvolgende maaltijd na het onderzoek neemt u de **helft van uw gebruikelijke ochtenddosering insuline**.

Neem altijd uw eigen insuline mee!

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, neemt u dan contact op met het endoscopiecentrum. Dit is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via (079) 346 25 09.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen van de folder enkele vragen beantwoorden? De vragen vindt u via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Hartelijk bedankt alvast.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

517306092023