

Rubberbandligatie locatie Zoetermeer

Deze folder geeft u informatie over de behandeling van aambeien door middel van rubberbandligatie. Aambeien (hemorroïden) zijn bloedvaten binnen of buiten de anus die zijn uitgezet en vaak samengaan met overtollig of uitgezakt slijmvlies.

Oorzaken en klachten

Aambeien kunnen ontstaan doordat er druk komt te staan op de endeldarm. Soms is dit ten gevolge van persen bij moeilijke stoelgang. Dit kan veroorzaakt worden door te weinig vochtinname, gebrek aan voedingsvezels of onvoldoende lichaamsbeweging. Bij vrouwen die kinderen hebben gekregen zijn de aambeien vaak ontstaan door de zwangerschap en bevalling.

Onderzoek

Omdat de klachten die bij aambeien voorkomen ook kunnen komen door andere afwijkingen van de endeldarm of anus komt u eerst voor onderzoek. Hierbij kijkt de arts uitwendig naar de anus en voert ook nog met de vinger een inwendig onderzoek uit. Zo nodig wordt er via een kijkonderzoek doormiddel van rectoscopie/ sigmoidoscopie in de darm gekeken.

Behandeling met rubberbandligatie

De chirurg gaat met een buisje de anus in. Via dat buisje kan de aambeï worden afgebonden door een elastiekje. De behandeling gebeurt poliklinisch en duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Verdoving is niet nodig. Het afgebonden weefsel zal tijdens de stoelgang na enige dagen, meestal vijf tot zeven dagen na het onderzoek, het lichaam verlaten.

Vorbereiding

Om het darmslijmvlies goed te beoordelen moet de darm zo goed mogelijk schoon zijn. Daarom krijgt u soms een klysma van tevoren. Als dit zo is krijgt u dit vóór de afspraak te horen. Op de dag van het onderzoek mag u gewoon eten.

Medicijngebruik

Door u gebruikte medicijnen kunt u ook op de ochtend van het onderzoek gewoon met water innemen. Het gebruik van ijzertabletten (staalpillen) dient u drie dagen vóór het onderzoek te stoppen. Meldt u het gebruik van bloedverdunners (antistolling) nadrukkelijk bij het maken van de afspraak!

Na de behandeling

De rubberbandjes kunnen een gevoel geven alsof u naar de wc moet. Ook kunt u een onbestemd gevoel in de onderbuik hebben. Na twee dagen is dit weg.

U mag twee dagen niet sporten en niet persen op het toilet.

Wij raden u aan iemand mee te nemen die u ook weer naar huis kan rijden.

Bij pijnklachten kunt u:

- Paracetamol nemen (liever geen tabletten die codeïne bevatten, deze kunnen verstopping veroorzaken)
- Een warm bad nemen kan de pijn verminderen
- Een koud kompres gebruiken

Bloedverlies kan optreden vanaf één of twee uur na de behandeling tot veertien dagen na de behandeling. Dit is over het algemeen niet ernstig en stopt vanzelf. In het geval van drie tot vier keer ontlasting bestaande uit vooral donkerrode stolsels moet u wel direct contact opnemen met het ziekenhuis.

Mogelijke complicaties

Een rubberbandligatie is een veilige behandelmethode. Toch kan er bij elk onderzoek/ behandeling een complicatie optreden. Soms nemen (ernstige) pijnklachten niet af of bloeden de aambeien erg na. Neemt u in dat geval contact op met het ziekenhuis. Wanneer het rubberbandje loslaat kan er wat bloedverlies optreden, wanneer dit meer is dan een kopje vol neemt u contact op met het ziekenhuis.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. U kunt contact opnemen met HagaZiekenhuis, locatie Zoetermeer:

- Polikliniek Chirurgie: elke werkdag van 08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer (079) 3462585.
- Endoscopiecentrum: via telefoonnummer (079) 3462509.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this

brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

517812092023