

Coloscopie voor diabetespatiënten die insuline en/of tabletten gebruiken

Uw huisarts of specialist heeft u doorverwezen voor een coloscopie op het Endoscopiecentrum van het HagaZiekenhuis Zoetermeer. U heeft over het onderzoek en de noodzakelijke voorbereidingen hiervoor een folder ontvangen. Omdat u diabetespatiënt bent en insuline of tabletten gebruikt, gelden voor u aanvullende richtlijnen.

In deze folder leest u waar u op moet letten.

Algemeen

- In principe wordt de afspraak voor uw scopie vóór 13.00 uur ingepland
- Belangrijk is dat u uw bloedsuiker op deze dag 's ochtends controleert
- Bij een hypoglycemie (laag bloedsuiker) mag u aangelengde limonade (geen rode limonade!) of 4-6 Dextro nemen, dit hoeft de endoscopie niet te hinderen. Wel is het belangrijk dat u dit meldt aan de endoscopie-assistente.
- Indien u een combinatie van tabletten en insuline gebruikt, volgt u zowel de instructies voor tablet gebruikers als die voor insulinegebruikers.

Richtlijnen tabletgebruikers

Coloscopie met Pleinvue

Metformine: medicatie staken vanaf het moment dat u begint met de Pleinvue (niet eten, dan óók geen tabletten). Bij de eerstvolgende maaltijd na het onderzoek begint u weer met de medicijnen. Breng deze mee!

Glycazide 30 mg

Bij gebruik van meerdere tabletten glycazide 30 mg, gebruikt u op de dagen van laxeren maar 1 tabl.

Glycazide 80 mg

Hierbij geldt, dat net als bij Metformine, de medicatie gestaakt moet worden op het moment dat u start met Pleinvue

Richtlijnen bij één maal daags langwerkende insuline

Het gaat hierbij om Insulatard, Levemir, Tresiba, Lantus of Toujeo, vaak in combinatie met tabletten.

De avonddosis langwerkende insuline wordt met 25% gereduceerd, d.w.z. u spuit $\frac{3}{4}$ van de gebruikelijke dosis . Een eventuele ochtenddosis langwerkende insuline wordt gehalveerd, maar wel gespoten.

Richtlijnen bij snelwerkende insuline

Het gaat hier om Novorapid, Fiasp, Actrapid, Humalog of Apidra
icm Insulatard, Levemir, Tresiba, Lantus of Toujeo

Op de dag van laxatie wordt de lunchdosis snelwerkende insuline aangepast aan de verminderde voedselinname, meestal betekent dit een halvering van de eenheden.

Het diner vervalt, dus u spuit geen snelwerkende insuline in de avond.

De snelwerkende insuline voor het ontbijt wordt overgeslagen of uitgesteld tot de eerste maaltijd na de scopie . Omdat u na de scopie een maaltijd wordt aangeboden dient u uw eigen insuline mee te nemen!

Richtlijnen bij gebruik mixpreparaten 2 maal daags

Het gaat hier om (Mixtard, Humamix, Novomix, Ryzodeg)

Dag vóór het onderzoek

- Op de dag dat u moet starten met Pleinvue (de ochtend vóór het onderzoek) gebruikt u
- Aangezien u geen avondeten gebruikt, spuit u 's avonds ook geen insuline.

Dag ván het onderzoek

U mag 's ochtends niet eten en u **gebruikt géén insuline**. Voor de eerstvolgende maaltijd na het onderzoek neemt u **de helft van uw gebruikelijke ochtenddos**is insuline.

Richtlijnen bij gebruik GLP₁

Het gaat hier om Victoza, Bydureon, Trulicity, Ozempic, Byetta, Lyxumia, Xultophy en Suliqua.

- Wat éénmaal per week gespoten wordt, en toevallig op de dag van laxeren of het onderzoek valt, eenmalig de medicatie op een andere dag, ná het onderzoek spuiten.
- De andere medicatie die 1 x per dag gespoten wordt, op de dag van laxeren achterwege laten en weer spuiten ná het onderzoek.

Contact

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u uw diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner bellen.

Het Endoscopiecentrum is bereikbaar (079) 346 25 09 van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

518315042023