

# Schaamlipcorrectie

## De behandeling

Een schaamlipcorrectie kan plaatsvinden onder plaatselijke verdoving. Bij plaatselijke verdoving worden uw schaamlippen geïnjecteerd met een verdovingsvloeistof en een oplossing die ervoor zorgt, dat tijdens de behandeling nauwelijks bloed vrijkomt.

De ingreep duurt ongeveer een uur. Voor de ingreep zal de plastisch chirurg uw schaamlippen aftekenen. De chirurg kan door middel van deze tekening een nauwkeurige inschatting maken hoeveel van de schaamlippen er weggenomen kan worden. De plastisch chirurg zal een gedeelte van de schaamlippen wegnemen en opnieuw modeleren. De wondjes worden gehecht met oplosbaar hechtmateriaal.

## Na de behandeling

De eerste dagen na de behandeling kan het operatiegebied wat pijnlijk aanvoelen. Het is daarom verstandig geen strakke broeken te dragen. Tevens is hygiëne erg belangrijk. Veel douchen/afspoelen en droog deppen. Het herstel na een schaamlipcorrectie neemt een week tot tien dagen in beslag. Doordat er is gewerkt met oplosbare hechtingen, hoeven deze

niet te worden verwijderd. Na ongeveer een week nemen we contact met u. Hiervoor is een afspraak voor u gemaakt.

Een schaamlipcorrectie heeft een blijvend resultaat. Het duurt vaak wel enkele weken tot maanden voordat het eindresultaat zichtbaar is. Dit heeft te maken met de hoeveelheid zwelling en de vorming van de littekens. Dit is uiteraard voor iedereen verschillend.

## Risico's en complicaties

U wordt uiteraard naar beste kunnen behandeld, maar bij elke operatie is er een kans op complicaties. De meest voorkomende complicaties zijn: allergische reactie op gebruikte verdovingsvloeistoffen of materialen, bloeduitstorting, nabloeding, infectie, ontstaan van een hypertrofisch litteken en trombose. Deze complicaties komen echter zelden voor.

Specifieke complicaties na een schaamlipcorrectie kunnen zijn: asymmetrie. Verstoorde wondgenezing en weefselversterf komen zeer zelden voor. Deze verschijnselen kunnen leiden tot een tegenvallend resultaat. Deze risico's en complicaties, evenals het belang van het stoppen met roken, zijn tijdens het consult met de arts met u besproken. Hoewel de operatie met de grootste zorg zal worden uitgevoerd, maar het genezingsproces per individu verschilt, is het voor ons niet mogelijk om garanties te geven.

## Ter voorbereiding

Besluit u tot behandeling over te gaan, dan volgen hieronder alvast enkele richtlijnen ter voorbereiding:

- Het is van belang dat u tijdig stopt met het innemen van uw medicijnen, indien nodig. U heeft dit met de plastisch chirurg besproken.
- Bij pijn kunt u paracetamol slikken, alle andere pijn bestrijdende middelen geven een bloedverdunning.
- Wij adviseren u, zodra de operatie gepland is, te stoppen met roken, omdat dit enorm bevorderend is voor het genezingsproces.
- Wij raden u aan 24 uur voor tot 24 uur na de ingreep geen alcohol te drinken

## Adviezen na een schaamlipcorrectie

- De eerste 2 dagen is het verstandig om koude kompressen te gebruiken. Dit kan door middel van een maandverband uit de vriezer (maandverband met water in een zakje). Nooit iets uit de vriezer direct tegen de huid. Altijd iets ertussen om vrieswonden te voorkomen.
- Om infectiegevaar zo klein mogelijk te maken en zwelling te beperken dient u de eerste 2/3 weken na de ingreep geen tampons te gebruiken en geen geslachtsgemeenschap te hebben.
- Na iedere toiletgang wondjes naspoelen met (lauw) water en droogdeppen.

- De eerste drie weken niet baden of in de sauna. Douchen mag.
- De eerste 2/3 weken niet sporten. Dit is om zwelling te beperken en door druk kan de wond open gaan.
- Het is normaal als het gezwollen is en beurs ziet.
- De eerste 2 weken kan er wat wondvocht uitkomen. Na het koelen is het verstandig om een maandverband te dragen voor het wondvocht.
- Krijgt u koorts, hevige pijn of bloeding, neem dan contact op met de polikliniek van de Plastische Chirurgie.

## Tot slot

Indien u vragen heeft na de ingreep kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. Bij nood, buiten kantooruren, kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp.

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met

de polikliniek Plastische Chirurgie. De polikliniek Plastische Chirurgie is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: **(079) 346 28 04**.

## **Wat vindt u van deze patiënteninformatie?**

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

### **Spreekt u geen of slecht Nederlands?**

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

### **Do you speak Dutch poorly or not at all?**

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

### **Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?**

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

## Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

557305102023