

Urodynamisch onderzoek

Binnenkort wordt bij u een urodynamisch onderzoek verricht. Het doel van het urodynamisch onderzoek is na te gaan wat de oorzaak is van uw plasklachten. Een urodynamisch onderzoek wordt vaak gedaan als u moeite heeft met plassen (obstructie) of ongewild urineverlies (incontinentie).

Ook wanneer u in combinatie met plasproblemen nog een andere aandoening heeft, bijvoorbeeld van het zenuwstelsel, of als niet duidelijk is wat uw klachten veroorzaakt, kan urodynamisch onderzoek inzicht geven in de oorzaak van uw probleem. Zo kan een gericht behandelingsadvies gegeven worden.

Het urodynamisch onderzoek is een onderzoek naar de functie van de lage urinewegen (blaas en afsluitmechanisme). Het is een inwendig onderzoek. Door dunne slangetjes in te brengen via de plasbuis en endeldarm (zie afbeelding) kunnen metingen gedaan worden. We meten de blaasinhoud, de blaasdruk, de afsluiting van de blaas, het eventuele urineverlies, de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning in de bekkenbodemspieren. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Vorbereiding

In verband met slangetjes die vastgeplakt moeten worden, vragen wij u om als het kan thuis het schaamhaar rond de schaamlippen en anus te scheren. Dit kan ook tijdens het onderzoek gedaan worden. Menstrueert u hevig of heeft u op de dag van het onderzoek een actieve blaasontsteking? Dan kan het onderzoek niet doorgaan. Belt u met de polikliniek om af te bellen, dan krijgt u een nieuwe afspraak.

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en wordt uitgevoerd door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u een kleedkamer aan, waar u uw onderlijf kunt ontkleden. Daarna plast u uit of op een speciale trechter, waarbij de kracht van de straal gemeten wordt. Daarna neemt u plaats op de onderzoekstafel. Daarop gaat u met opgetrokken en gespreide benen liggen.

De verpleegkundige brengt een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in de blaas. Met deze katheter wordt gemeten hoeveel urine nog in de blaas aanwezig is. Deze katheter wordt verwijderd. Daarna wordt een dunne drukkatheter ingebracht. Deze meet de druk in de blaas en plasbuis.

De laatste katheter wordt via de anus in de endeldarm ingebracht om de druk in uw buik te meten.

Het inbrengen van de katheters is niet pijnlijk, maar kan wel een onaangenaam gevoel geven. De katheters worden op de huid vastgeplakt met pleisters zodat deze op hun plaats blijven. Er worden 3 elektrodes geplakt: 2 naast de anus en 1 op het bovenbeen. Hiermee wordt de activiteit van de bekkenbodemspieren gemeten.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt in zittende houding plaats of liggend op een speciale onderzoekstafel. Via de katheter in de blaas wordt de blaas gevuld met steriel zoutoplossing. Tijdens het vullen meet de computer de druk in uw blaas en de druk in uw buik. Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen, moet u dit aangeven. Tijdens het onderzoek wordt u een paar keer gevraagd om te hoesten of te persen. Dit is vooral van belang bij patiënten met ongewild urineverlies (incontinentie).

De blaas wordt verder gevuld tot u aangeeft dat u sterke drang tot plassen hebt en de plas niet meer op kunt houden. Als de verpleegkundige het zegt, mag u uitplassen langs de katheter in de blaas. Daarna worden de katheters en plakkers verwijderd en is het onderzoek afgelopen.

Nazorg

De uroloog of gynaecoloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Na het onderzoek kunt u vrijwel direct naar huis. Gebruik van de auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Bijwerkingen

Op de dag van het onderzoek kunt u last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen. Ook kan u een verhoogde drang tot plassen hebben. Dit komt doordat de plasbuis geïrriteerd is door de katheters. Bij sommige patiënten duren deze klachten enkele dagen. Dit is niet verontrustend. Soms treedt bloedverlies op via de plasbuis.

Wij raden u aan om na het onderzoek extra te drinken. Houdt u na het onderzoek langdurig klachten? Of krijgt u veel pijn, koorts of kunt u veel moeilijker plassen? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Bent u ziek of verhinderd?

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de polikliniek Urologie bereikbaar. Bereikbaar:

- van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur
- Den Haag telefoonnummer: (070) 210 6482
- Zoetermeer telefoonnummer: (079) 3462860

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to

you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

563515042025