

Vacuümbiopt van de borst

U heeft binnenkort een afspraak voor het afnemen van een vacuümbiopt op de afdeling Radiologie. Hieronder leest u meer over dit onderzoek. Deze informatie komt niet in de plaats van een gesprek met uw arts. De arts/of verpleegkundige is altijd bereid om u een en ander uit te leggen.

Doel van het onderzoek

Een vacuümbiopt is een onderzoek waarbij een stukje weefsel uit de borst wordt weggehaald met begeleiding van de röntgenfoto's.

Onderzoek

- U wordt plaatselijk verdoofd, zodat u tijdens het onderzoek zo min mogelijk pijn ervaart.
- Geheel pijnloos is het onderzoek niet.
- Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek is er steeds een laborante aanwezig. Zij geeft u uitleg over alles wat er gaat gebeuren tijdens het onderzoek. Zij kan uw eventuele vragen beantwoorden.

De procedure kan zittend of liggend worden uitgevoerd, dit is afhankelijk van de plaats van de afwijking die aangeprikt moet worden. Eerst worden opnieuw foto's gemaakt om de exacte plaats van de afwijking te bepalen. Als de goede plek gevonden is blijft uw borst beklemd tussen de röntgenplaten.

Uw huid wordt ontsmet met alcohol. Hierna wordt de huid en het gebied waar de biopten genomen worden verdoofd.

De radioloog maakt daarna een sneetje in de huid. De naald wordt hier doorheen geplaatst. Deze naald zit vast aan een vacuümsysteem. Dit systeem maakt tijdens de hele procedure een brommend geluid. Er wordt door middel van foto's gecontroleerd of er niets is verschoven. Als de naald op de goede plek zit worden er meerdere biopten genomen. De biopten worden gefotografeerd om te controleren of de afwijking in de biopten aanwezig is.

Daarna wordt er een marker achtergelaten op de plaats van de bioptie. Deze marker is enkele maanden zichtbaar op de echografie en altijd zichtbaar op de röntgenfoto's.

Na het onderzoek

Het wondje wordt afgeplakt met kleine pleisterstrips. Deze strips moeten drie dagen blijven zitten. Daarna mag u deze zelf verwijderen. Over de pleisterstrips heen wordt een verbandpleister geplakt. Deze mag u zelf eventueel na 48 uur verschonen.

Het is raadzaam een goed steunende bh, zonder beugels mee te nemen naar het onderzoek. Deze bh moet u (tenminste) de eerste 48 uur dragen (dag en nacht). Dit zorgt voor minder pijn en verlaagd het risico op een nabloeding.

Waarschijnlijk zal er een bloeduitstorting ontstaan in de borst. Nadat de verdoving is uitgewerkt kan de borst gevoelig zijn. U mag paracetamol als pijnstillers gebruiken, maximaal 4x per dag twee tabletten van 500mg. Liever geen aspirine want dit werkt deels bloedverdunnend.

Wij raden u af om binnen 48 uur na het biopt zwaar huishoudelijk werk te verrichten of intensieve sport te beoefenen. Probeer zwaar tillen te vermijden.

Informatie over de nazorg krijgt u van de radiodiagnostisch laboranten welke bij het onderzoek aanwezig zijn.

Uitslag

De radioloog zal het beloop van het onderzoek schriftelijk meedelen aan uw behandelend chirurg. De patholoog zal de afgenomen bipten/weefsel onderzoeken en ook deze uitslag schriftelijk doorgeven aan uw behandelend chirurg. Dit onderzoek neemt enkele dagen in beslag. Ongeveer 4 werkdagen na het onderzoek heeft u een afspraak bij uw behandelend chirurg. Deze zal de uitslagen met u bespreken.

Let op!

Gebruikt u bloedverdunners of bent u allergisch?

Bloedverdunners

Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, meldt dit dan aan de arts die u verwijst. Bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen hoort u van uw behandelend arts vanaf wanneer u met deze middelen moet stoppen.

- Het gebruik van Ascal (carbasalaatcalcium) of acetylsalicylzuur dient 5 dagen voor het onderzoek te worden gestopt.
- Bij gebruik van acenocoumarol (Sintrom Mitis®) of fenprocoumon (Marcoumar®) moet u het stopadvies van de arts volgen en dient 1 dag voor het onderzoek bloedafname plaats te vinden, om de INR (stollingstijd) te controleren

Allergie

Indien u allergisch bent voor bepaalde medicatie, meldt dit dan aan de arts die u verwijst. Er kan dan rekening worden houden met uw allergie.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 20.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,

postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

563928072023