

Zwangerschapsafbreking via medicijnen

Patiënten informatie over Abortuspil

U heeft met uw behandelend arts besproken om te gaan starten met de “abortuspil”. De abortuspil bestaat uit een combinatie van tabletten, namelijk mifepriston (Mifegyn®) en misoprostol (Cytotec®), die op verschillende dagen moeten worden ingenomen. Deze combinatie kan gebruikt worden tot ongeveer 63 dagen na de eerste dag van de laatste menstruatie. Het eerste medicijn (mifepriston) zorgt er in de meeste gevallen voor dat de zwangerschap niet meer verder groeit. Het tweede medicijn (misoprostol) leidt tot een bloeding waarmee u de zwangerschap verliest.

Misoprostol (Cytotec®) is niet officieel geregistreerd voor het beëindigen van de zwangerschap. Misoprostol (Cytotec®) is op de markt gebracht als medicijn tegen maagklachten en is hiervoor geregistreerd. Dit betekent niet dat dit medicijn moet worden ontraden als middel om een zwangerschapsafbreking op gang te brengen. Uit wetenschappelijk onderzoek is afdoende vast komen te staan dat misoprostol, in combinatie met mifepriston, zeer effectief en veilig is om een abortus op gang te brengen. Het succespercentage neemt af met een toegenomen zwangerschapsduur.

Bijwerkingen

De medicatie heeft nauwelijks tot geen bijwerkingen. In zeldzame gevallen ontstaat huiduitslag. Soms gaat gebruik gepaard met:

- Diarree
- Misselijkheid
- Buikpijn
- Rillen
- Koorts van 38°C tot 40°C
- Hoofdpijn
- Duizeligheid

Behandeling

Start mifepriston	Datum	Dosis
		1 x tablet van 200 mg
Start misoprostol	Datum	Dosis
		4 x tablet van 200 µg

Om de abortus op gang te brengen krijgt u op de polikliniek 1 tablet van 200 mg mifepriston, om met water in te nemen, en een recept voor 4 tabletten misoprostol, welke u bij uw eigen apotheek ophaalt; deze 4 worden 24 – 48 uur later met water ingenomen of vaginaal ingebracht. Uiteraard kunt u ook starten op een later voor u gelegen moment.

Het kan enige tijd duren voordat de medicijnen gaan werken en de baarmoedermond open gaat. Dit gaat gepaard met buikkrampen, maar het betekent niet dat u de hele tijd buikkrampen heeft. U kunt bij pijn eventueel 4 x daags 1000 mg paracetamol en/of 3 x daags 250 mg naproxen innemen. Over het algemeen komt de miskraam binnen 24 uur na het inbrengen van de tabletten op gang. Het duurt vaak niet langer dan 48 uur.

Wanneer neemt u contact op met de polikliniek

- Bij aanhoudend ruim bloedverlies.
- Bij temperatuur boven de 38.5 °C.
- Bij pijn die niet te dragen is ondanks het gebruik van paracetamol of naproxen.

De polikliniek gynaecologie is te bereiken tijdens kantooruren op nummer 079-3462589 (keuze 2). In het weekend en avond kunt u contact opnemen met het algemene nummer van het ziekenhuis 079-3462626 en vragen naar de dienstdoende spoedeisende hulparts.

Als er na 48 uur nog geen bloeding heeft plaatsgevonden neemt u tijdens kantooruren contact op met de polikliniek gynaecologie om de controle afspraak te vervroegen.

Controle afspraak

Wanneer de abortus op gang is gekomen na de behandeling met medicatie zal er na 2 weken een controle afspraak worden gepland. Indien nodig zal worden gekeken of de abortus volledig is geweest. In 2-10% van de gevallen is alsnog een curettage nodig wegens een achterblijvende rest van de zwangerschap, een nog bestaande zwangerschap of bij ernstig bloedverlies. Bij een mislukking van de behandeling is curettage nodig omdat het gebruik van deze stoffen kan leiden tot afwijkingen bij de vrucht. Het is belangrijk dat u voor deze controle langs komt.

Na de behandeling

Na een behandeling met medicatie komt uw eerstvolgende menstruatie meestal na 6-8 weken op gang.

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek gynaecologie. De polikliniek is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer 079-3462589 (keuze 2). U kunt uw vragen ook stellen aan uw behandelend arts op de polikliniek.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

568329112023