

Medicatie bij een miskraam

U heeft met uw behandelend arts besproken om te gaan starten met de medicamenteuze behandeling van uw miskraam. Deze medicatie bestaat uit een combinatie van tabletten, namelijk mifepriston (Mifegyn®) en misoprostol (Cytotec®), die op verschillende dagen moeten worden ingenomen. Deze combinatie kan gebruikt worden tot ongeveer 63 dagen na de eerste dag van de laatste menstruatie of indien de lengte van het embryo niet groter is dan 9 weken. De miskraambehandeling met medicatie is momenteel de eerste keus voor behandeling, het brengt minder risico's met zich mee dan een andere behandeling. Door de medicatie wordt de baarmoedermond week en wordt de miskraam in gang gezet.

Misoprostol (Cytotec®) is niet officieel geregistreerd voor het beëindigen van de zwangerschap. Misoprostol (Cytotec®) is op de markt gebracht als medicijn tegen maagklachten en is hiervoor geregistreerd. Dit betekent niet dat dit medicijn moet worden ontraden als middel om een miskraam op gang te brengen. Uit wetenschappelijk onderzoek is afdoende vast komen te staan dat misoprostol, in combinatie met mifepriston, zeer effectief en veilig is om een miskraam op gang te brengen. Het succespercentage neemt af met een toegenomen zwangerschapsduur.

Bijwerkingen

De medicatie heeft nauwelijks tot geen bijwerkingen. In zeldzame gevallen ontstaat huiduitslag. Soms gaat gebruik gepaard met:

- Diarree
- Misselijkheid
- Buikpijn
- Rillen
- Koorts van 38°C tot 40°C
- Hoofdpijn
- Duizeligheid

Tijdschema

Start mifepriston	Datum	Dosis
		1 x tablet van 200 mg
Start misoprostol	Datum	Dosis
		4 x tablet van 200 µg

Schema

Om de abortus in gang te zetten krijgt u een recept van de gynaecoloog. Het recept bestaat uit 1 tablet mifepriston en 4 tabletten misoprostol. Deze kunt u ophalen bij uw eigen apotheek. De mifepriston kunt u innemen met water. De misoprostol neemt u 24 tot 48 later met water of brengt u vaginaal in. Uiteraard kunt u ook starten op een later voor u gelegen moment.

Het kan enige tijd duren voordat de medicijnen gaan werken en de baarmoedermond open gaat. Dit gaat gepaard met buikkrampen, maar het betekent niet dat u de hele tijd buikkrampen heeft.

U kunt bij pijn eventueel 4 x daags 1000 mg paracetamol en/of 3 x daags 250 mg naproxen innemen. Over het algemeen komt de miskraam binnen 24 uur na het inbrengen van de tabletten op gang. Het duurt vaak niet langer dan 48 uur.

Wanneer neemt u contact op met de polikliniek

- Bij aanhoudend ruim bloedverlies
- Bij een temperatuur boven de 38,5°C
- Bij pijn die niet te dragen is ondanks het gebruik van paracetamol of naproxen

De polikliniek Gynaecologie is te bereiken tijdens kantooruren op het telefoonnummer 079-346 2589 (keuze 2). In het weekend en de avonden kunt u bellen naar het algemene nummer van het ziekenhuis 079-346 2626 en vragen naar de dienstdoende spoedeisende hulparts.

Als er na 48 uur nog geen miskraam heeft plaatsgevonden neemt u contact op met de polikliniek Gynaecologie om de controle afspraak te vervroegen.

Controleafspraak

Wanneer de miskraam op gang is gekomen na de behandeling met medicatie, wordt er na twee weken een controleafspraak gepland. Indien nodig zal worden gekeken of de miskraam volledig is geweest.

Bij een klein deel van de patiënten (ongeveer 10%) komt na het gebruik van de medicatie de miskraam nog steeds niet op gang; de medicatie kan dan worden herhaald of er wordt een curetage afgesproken. Het is dus belangrijk dat u voor deze controle langs komt.

Na de behandeling

Na een behandeling met medicatie komt uw eerstvolgende menstruatie meestal na 6-8 weken op gang.

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie.

De polikliniek is bereikbaar:

- van maandag - vrijdag
- van 8.30 uur tot 16.30 uur
- via telefoonnummer (079) 346 2589, (keuze 2)

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

573309052025