

Ballondilatatie bij een vernauwing van de plasbuis

De uroloog heeft u verteld dat u een vernauwing van de plasbuis (urethrastrictuur) heeft. Een vernauwing van de plasbuis kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door katheterisatie (een buisje inbrengen via de plasbuis) of door een trauma (zoals een val op een fietsstang). Regelmatig wordt er ook geen oorzaak gevonden. Een plasbuisvernauwing kan op meerdere manieren behandeld worden. Samen met uw uroloog heeft u besloten tot een ballondilatatie. In deze folder leest u over deze behandeling.

Behandeling ballondilatatie

Bij een ballondilatatie wordt de vernauwing van de plasbuis opgerekt met een ballonnetje. Op de ballon zit het medicijn paclitaxel, dat door het oprekken van de ballon op de plek van de vernauwing wordt afgegeven. Dit medicijn wordt al tientallen jaren veilig gebruikt bij dotterbehandelingen bij vernauwde bloedvaten. Het helpt om littekenvorming te remmen, zodat de vernauwing minder kans heeft om terug te komen.

Zwangerschapswens

Heeft u op dit moment of in de komende 6 maanden een zwangerschapswens met uw partner? Meld dit dan vooraf bij de uroloog. Het medicijn paclitaxel wordt dan afgeraden.

Sedatie

Deze ingreep vindt plaats onder sedatie. Dat is een lichte vorm van narcose waarbij u wel zelf blijft ademen. Dit betekent dat u slaapt tijdens de behandeling en u hier niets van merkt.

Verloop van de behandeling

De uroloog brengt eerst een katheter in het begin van de plasbuis. Vervolgens kijkt de uroloog met contrast en röntgenbeelden waar de vernauwing is. Daarna plaatst de uroloog de ballonkatheter over het draadje tot op de plek van de vernauwing. De ballon wordt opgeblazen en blijft 10 minuten zitten, zo wordt de vernauwing opgerekt en komt het medicijn in de wand van de plasbuis. Daarna wordt de ballon leeggelaten en verwijderd. Na de behandeling krijgt u geen katheter.

Vorbereiding op de behandeling

- U krijgt via het secretariaat te horen wanneer u geholpen wordt, waar en hoe laat u zich die dag kunt melden.
- Gebruikt u bloedverdunnende middelen? Meld dit dan aan uw uroloog.
- U moet nuchter zijn voor de operatie. Dit betekent dat u vanaf 0.00 uur de avond voor de operatie niet meer mag eten. Tot 2 uur voordat u zich moet melden in het ziekenhuis, mag u alleen heldere vloeistoffen (water, thee zonder suiker en/of melk) drinken.
- Op de afdeling krijgt u voor de ingreep nog paracetamol en antibiotica van de verpleegkundige.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u wakker op de uitslaapkamer. Daar blijft u een uur ter controle. Als het goed gaat mag u daarna naar huis. Tot 2 weken na de behandeling kunt u bij het plassen een branderig gevoel ervaren of wat bloed bij de urine zien.

Pijnstilling thuis

Als u pijn heeft mag u 3x per dag twee tabletten paracetamol van 500 milligram gebruiken. Als dat onvoldoende effect heeft, mag u bij de paracetamol nog extra nemen: 2x per dag ibuprofen 200 mg of naproxen 275 mg. Als dit nog steeds onvoldoende werkt, moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Na de behandeling krijgt u een afspraak op de polikliniek met een plastest ter controle van het resultaat.

Complicaties

Complicaties die zich kunnen voordoen na deze behandeling zijn:

- Infectie: ontsteking van het weefsel bij de vernauwing of een urineweginfectie
- Nabloeding: bloedverlies dat duidelijk meer is dan de druppels bloed bij de urine die te verwachten zijn
- Recidief: het terugkeren van de vernauwing in de plasbuis.

Resultaten van de operatie

Bij 70% van de mensen die deze behandeling ondergaan, blijft de plasbuisvernauwing weg.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek urologie:

- van maandag tot en met donderdag
- tussen 8.00 en 16.30 uur
- via telefoonnummer 070 210 6482
- bij problemen buiten kantoortijden kunt u bellen naar nummer 070 210 2060

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

591924092026